


اختبار في مادة الرياضيات

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
02	3×0.25	<u>الجزء الأول: (12 نقطة)</u> <u>التمرين الأول: (03 نقاط)</u> (1) كتابة m و n على شكل $a\sqrt{7} + b$: $m = \sqrt{112} - 3\sqrt{28} + 3\sqrt{7} - \sqrt{25}$ $= \sqrt{16 \times 7} - 3\sqrt{4 \times 7} + 3\sqrt{7} - 5$ $= 4\sqrt{7} - 6\sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 5$ $= \sqrt{7} - 5$ $n = (\sqrt{7} + 3)(4 - \sqrt{7})$ $= 4\sqrt{7} - 7 + 12 - 3\sqrt{7}$ $= \sqrt{7} + 5$ (2) حساب $m \times n$: $m \times n = (\sqrt{7} - 5)(\sqrt{7} + 5)$ $= 7 - 25$ $= -18$ (3) جعل مقام النسبة $\frac{\sqrt{7}-5}{\sqrt{7}}$ ناطق : $\frac{\sqrt{7}-5}{\sqrt{7}} = \frac{(\sqrt{7}-5)\sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{7-5\sqrt{7}}{7}$
	2×0.25	
	0.25	
	0.25	
0.5	0.25	<u>التمرين الثاني: (03 نقاط)</u> (1) نشر العبارة E : $E = (4x - 1)^2 - (3x + 2)(4x - 1)$ $= (16x^2 + 1 - 8x) - (12x^2 - 3x + 8x - 2)$ $= 16x^2 + 1 - 8x - 12x^2 - 5x + 2$ $= 4x^2 - 13x + 3$ (2) تحليل العبارة E : $E = (4x - 1)^2 - (3x + 2)(4x - 1)$ $= (4x - 1)[(4x - 1) - (3x + 2)]$ $= (4x - 1)(4x - 1 - 3x - 2)$ $= (4x - 1)(x - 3)$
0.5	0.25	
0.5	0.25	
01	2×0.25	(1) نشر العبارة E : $E = (4x - 1)^2 - (3x + 2)(4x - 1)$ $= (16x^2 + 1 - 8x) - (12x^2 - 3x + 8x - 2)$ $= 16x^2 + 1 - 8x - 12x^2 - 5x + 2$ $= 4x^2 - 13x + 3$ (2) تحليل العبارة E : $E = (4x - 1)^2 - (3x + 2)(4x - 1)$ $= (4x - 1)[(4x - 1) - (3x + 2)]$ $= (4x - 1)(4x - 1 - 3x - 2)$ $= (4x - 1)(x - 3)$
01	0.25	
	0.25	
	0.25	


اختبار في مادة الرياضيات

0.5	0.25 0.25	(3) حل المعادلة $(4x-1)(x-3)=0$: $(4x-1)(x-3)=0$ معناه $x-3=0$ أو $4x-1=0$ و منه $x=3$ أو $x=\frac{1}{4}$ (4) حل المتراجحة: $4x^2-13x+3 \leq 4x^2+29$ $-13x \leq 26$ $x \geq -2$
1.75	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	التمرين الثالث: (03 نقاط) (1) حساب بالتدوير إلى الدرجة $\widehat{BAC}$ ABC مثلث محاط بالدائرة التي قطرها [AB] فإن: المثلث ABC قائم في C ومنه: $\sin \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB}$ $= \frac{3}{8} = 0,375$ $\widehat{BAC} = 22,02^\circ$ فإن: $= 22^\circ$ - استنتاج $\widehat{BOC}$: $\widehat{BOC}$ و $\widehat{BAC}$ زاويتان إحداها مركزية والأخرى محيطية تحصران نفس القوس $\widehat{BC}$ فإن: $\widehat{BOC} = 2 \times 22^\circ = 44^\circ$ ومنه: $\widehat{BOC} = 2 \widehat{BAC}$ (2) حساب DF : في المثلث ADF لنا $(BC) \parallel (DF)$ ومنه: $\frac{AB}{AF} = \frac{BC}{FD}$ بالتعويض نجد: $DF = \frac{12 \times 3}{8} = 4,5 \text{ cm}$ ومنه: $\frac{8}{12} = \frac{3}{DF}$
0.5	0.5	

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الرابع: (03 نقط)

(1) تعليم النقط :



(2) حساب AC :

$$AC = \sqrt{(-4-2)^2 + (-3+1)^2}$$

$$= \sqrt{36+4}$$

$$= 2\sqrt{10}$$

فإن المثلث ABC متساوي الساقين قاعدته [AB] $AC = BC = 2\sqrt{10}$

(3) حساب إحداثيي النقطة D :

$$\overline{CA}(2+4; -1+3) ; \overline{CA}(6; 2)$$

$$\overline{BD}(x+2; y-3) \text{ ومنه:}$$

$$\overline{CA} = \overline{BD} \text{ معناه } x+2=6 \text{ و } y-3=2$$

$$\text{ومنه: } x=4 \text{ و } y=5 \text{ أي } D(4; 5)$$

(4) إثبات أن $(AB) \perp (CD)$:في الرباعي CADB لنا $\overline{CA} = \overline{BD}$ فهو متوازي الأضلاعوبحيث: $AC = BC$ فهو معين ومنه: $(AB) \perp (CD)$

اختبار في مادة الرياضيات

الرقم	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع

اختبار في مادة الرياضيات

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	المجموع
	(4) — حل المعادلة : $f(x) = g(x)$ $10x = 8x + 500$ $2x = 500$ $x = 250$ يمثل الحل نقطة تقاطع المنحنيين ويمثل عدد الجرائد المشتراة بالصيغتين معا (5) أ. حساب ثمن 150 جريدة بالصيغة الأولى : $f(150) = 10 \times 150 = 1500$ — حساب ثمن 150 جريدة بالصيغة الثانية : $g(150) = 8 \times 150 + 500 = 1700$ إذن الصيغة الأولى هي الأفضل لإقتناء 150 جريدة . ب. حساب ثمن 270 جريدة بالصيغة الأولى : $f(270) = 10 \times 270 = 2700$ — حساب ثمن 270 جريدة بالصيغة الثانية : $g(270) = 8 \times 270 + 500 = 2660$ نقول أن الصيغة الثانية هي الأفضل لإقتناء 270 جريدة . ملاحظة: يمكن استعمال المنحنى البياني لتحديد الصيغة الأفضل في الحالتين.			

اختبار في مادة الرياضيات

شبكة التقويم

رد	مؤشرات المعيار الثالث	الوزن	مؤشرات المعيار الثاني	الوزن	مؤشرات المعيار الأول	الأسئلة
2	- الحسابات صحيحة . - النتائج معقولة .	0.25	الحساب لملء الجدول .	0.25	اختبار العمليات المناسبة .	1
1.50	$f(x)$ دالة خطية و $g(x)$ دالة تألفية.	1	كتابة $f(x) = 10x$ $g(x) = 8x + 500$	0.25	التعبير عن الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x	2
1	التمثيل البياني واضح مع احترام وحدات الترتيب .	0.50	التمثيل البياني صحيح	0.25	معرفة تعليم نقاط في المستوى حسب الدالتين $f(x)$ و $g(x)$.	3
1	حل المعادلة هو : $x = 250$ تفسير الحل .	0.50	عزل المجهول $x = \frac{500}{2} = 250$	0.25	كتابة المعادلة $10x = 8x + 500$	4
1.50	$f(150) = 1500$ مع الشرح . $g(270) = 2700$ مع تفسير الحل.	0.5	حساب $f(150) = 10 \times 150$ $g(150) = 8 \times 150 + 500$ حساب $f(270) = 10 \times 270$ $g(270) = 8 \times 270 + 500$	0.25	معرفة حساب صورة عدد بالدالتين . $f ; g$	5
1	مؤشرات المعيار الرابع (عدم التشطيب ، المقروئية ، التصريح بالإجابة)					