سلم: رياضيات | شعبة: علوم دقيقة | بكالوريا دورة 1999

99

تمرين الأول: 5 نقاط

- إثبات العدد المختلط ... 1
- تا(ن) = ... 1/2
- ... 1/2
- ... 1/2
- ... 1/2
- ... 1/2
- ... 1/2
- ... 1/2
- تحليل ج إلى مركب تماطلي محور يعين ... 1/2
- ج = ... 1/2

تمرين الثاني: 5 نقاط

- إثبات أن المميز ... 1/2
- ... 1/2
- حل المعادلة: ... 1/2
- ... 1/2
- البرهان أن ... 1/4
- طبيعة المعادلة في المجموعة الثانية: ... 1/2
- المجموعة تمثل العدد التخيلي ن: ... 1
- ج = ... 1/2
- ج هي القوس ... 1/4
- إنشاء ج ... 1/4

المسألة: 9 نقاط

I - 1) إثبات النقطة الثابتة ... 1/4

ع = ... 1/4

تا(س) = ... 1/2

... 1/4

س	$-\infty$		$+\infty$
تا'(س)	+	0	+
تا(س)	$-\infty$		$+\infty$

1

س	$-\infty$	$-\frac{\beta}{\alpha}$	$+\infty$
تا'(س)	−	0	+
تا(س)	$+\infty$	تا$(-\frac{\beta}{\alpha})$	$+\infty$

ط = ... ، تا ثابتة ... 1/4

1

س	$-\infty$	$-\frac{\beta}{\alpha}$	$+\infty$
تا'(س)	+	0	−
تا(س)	$-\infty$	تا$(-\frac{\beta}{\alpha})$	$-\infty$

II - 1) جدول تغيرات تا ... 1/4

- إنشاء تا(س) ... 1/4
- النقطة الإضافية: ... 1/4
- معادلة المماس (Δ): ... 1/4
- النوع الطوبولوجية للمنحنى (C).
- في جوار $+\infty$ نوع شلغم باتجاه محور التراتيب ... 1/4
- في جوار $-\infty$ نوع شلغم باتجاه محور التراتيب ... 1/4

30

ب- $\lim_{x \to -\infty} g(x) = 0$ $\frac{1}{4}$

. جدول تغيرات g $\frac{1}{2}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

. جدول تغيرات h $\frac{1}{2}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$+$	
$h(x)$	0	↗	0	↗	$+\infty$

نوضح (C_f) بالنسبة لـ (Δ)

. (C_f) فوق (Δ) على $]0, +\infty[$
(C_f) تحت (Δ) على $]-\infty, 0[$ $\frac{1}{2}$
(C_f) يقطع (Δ) في $A(0;0)$

ب- رسم (Δ) ، (C_f) $\frac{1}{2}$

ج- المساحة تساوي $\frac{1}{4}$ cm^2 $\frac{1}{2}$

III- 1) $\begin{cases} z = e^x \\ y = x \end{cases}$ $\frac{1}{4}$

. الحصول على المعادلة :

$h(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - x = 0$ $\frac{1}{2}$

. الوصول إلى : $x = \ln(z + \sqrt{z^2+1})$ $\frac{1}{2}$

2- رسم (Γ) $\frac{1}{2}$

د- $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ $\frac{1}{4}$

. $\frac{\sqrt{2}}{2} \leq g'(x) \leq 1$ $\frac{1}{4}$

ب- $\frac{e^{x_n} - e^{x_0}}{x_n - x_0} = \frac{1}{x_n - x_0} \int_{x_0}^{x_n} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$ $\frac{1}{4}$

. $\frac{e^{x_n} - e^{x_0}}{x_n - x_0} \leq 1$ $\frac{1}{4}$

. $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{1+x_0} \leq \frac{e^{x_n} - e^{x_0}}{x_n - x_0} \leq \frac{1}{1+x_0}$ $\frac{1}{2}$

