

الإجابة النموذجية

عدد الصفحات 4

العلامة		عناصر الإجابة الموضوع الأول
المجموع	مجزأة	
3 نقاط		التمرين الأول (3 نقاط)
	0,75+0,25	1. الإجابة الصحيحة هي (ب-) لأن $V_{n+1} = 3 V_n$
	0,75+0,25	2. الإجابة الصحيحة هي (ج-) لأن $U_n = -\frac{1}{2}3^n - \frac{1}{2}$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$
	0,75+0,25	3. الإجابة الصحيحة هي (ج-) لأن $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n = -\frac{1}{2} \frac{3^{n+1} - 1}{2}$
5 نقاط		التمرين الثاني (5 نقاط)
	1	1. المعادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$ هي : $-2x + y + 5z - 1 = 0$
	0,5	2. أ- التحقق أن إحداثيات $B(-1;4;-1)$ تحقق معادلة كل من $(\mathcal{P})$ و $(\mathcal{Q})$
	0,5	ب- $\vec{n}$ و $\vec{n}'(1;2;0)$ غير متوازيين و منه $(\mathcal{P})$ و $(\mathcal{Q})$ متقاطعان وفق مستقيم (Δ)
	0,5	تمثيله الوسيط: $t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = 7 - 2t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$
	0,5	3. أ- المسافة بين C و $(\mathcal{P})$: $d_1 = \frac{3\sqrt{30}}{5}$
	0,5	- المسافة بين C و $(\mathcal{Q})$: $d_2 = \frac{6\sqrt{5}}{5}$
	1	ب- $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ و منه $(\mathcal{P})$ و $(\mathcal{Q})$ متعامدان.
0,5	ج- استنتاج المسافة بين النقطة C والمستقيم (Δ) : $d(C;(\Delta)) = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = 3\sqrt{2}$	
5 نقاط		التمرين الثالث (5 نقاط)
	0.75	1. أ- الشكل الجبري للعدد المركب: $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$
	0.5 x 2	ب- طول $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ و عمده له: $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}$ و $\left \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right = 1$
	0,5	- طبيعة المثلث ABC : المثلث ABC متساوي الساقين وقائم في A .
	0,5	2. أ- طبيعة T محددا عناصره المميزة: T هو الدوران ذو المركز A والزاوية $\frac{\pi}{2}$.
	0,5	ب- استنتاج صورة النقطة B بالتحويل T : $T(B) = C$

العلامة		تابع عناصر الإجابة للموضوع الأول												
المجموع	مجزأة													
0,5		3. أ. $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$ و منه A، C، D في استقامية.												
0,5		ب. تعيين نسبة التحاكي $h: K = \frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = \frac{3}{2}$												
0,75		ج. لدينا $z_D - z_A = a(z_B - z_A)$ و منه $a = \frac{3}{2}i$ عناصر التشابه S هي المركز A والنسبة $\frac{3}{2}$ والزاوية $\frac{\pi}{2}$.												
التمرين الرابع (7 نقاط)														
0,5		(I) أ. جدول تغيرات الدالة g.												
		<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>-1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g'(x)$</td> <td colspan="2">+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	-1	$+\infty$	$g'(x)$	+		+	$g(x)$	1	$+\infty$	$-\infty$
x	$-\infty$	-1	$+\infty$											
$g'(x)$	+		+											
$g(x)$	1	$+\infty$	$-\infty$											
0,5		ب. $g(x) > 0$ تكافئ $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$.												
0,5		ج. $0 < g(x) < 1$ تكافئ $x \in]1; +\infty[$.												
1		(II) 1. حساب النهايتين: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$												
0,5		$x = 1$ و $y = 1$ معادلنا مستقيمين مقاربين لـ C_f												
0,5	7 نقاط	2. أ. نبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$ ، $g'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$												
0,5+1		ب. $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} \left(\frac{2x}{x-1} \right)$ ، $f'(x) > 0$ لأن $x > 1$												
0,5		ج. جدول تغيرات الدالة f:												
		<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td colspan="2">+</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\infty$</td> <td>1</td> </tr> </table>	x	1	$+\infty$	$f'(x)$	+		$f(x)$	$-\infty$	1			
x	1	$+\infty$												
$f'(x)$	+													
$f(x)$	$-\infty$	1												
0,5		3. أ. $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) < 0$ على المجال $]1; +\infty[$:												
0,5		ب. نضع $h(x) = (x - \alpha) \ln(x - \alpha) - x$ و منه $h'(x) = \ln(x - \alpha)$												
0,5		ج. التحقق: $g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$ ، $F(x) = x - (x+3) \ln(x+1) + (x-1) \ln(x-1)$												

العلامة		عناصر الإجابة للموضوع الثاني
المجموع	مجازة	
4 نقاط		التمرين الأول (4 نقاط)
	1	1. أ - (v_n) هندسية أساسها α لأن: $v_{n+1} = \alpha v_n$
	0,5	ب - عبارة v_n بدلالة n و α : $v_n = \left(6 + \frac{1}{\alpha - 1}\right) \alpha^n$
	0,5	- استنتاج عبارة u_n بدلالة n و α : $u_n = \left(6 + \frac{1}{\alpha - 1}\right) \alpha^n - \frac{1}{\alpha - 1}$
	0,5	ج - تكون المتتالية (u_n) متقاربة إذا كان $\alpha \in]0; 1[$
	0,75	2. نضع $\alpha = \frac{3}{2}$: - حساب بدلالة n ، المجموع S_n : $S_n = 16 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1 \right]$
	0,75	- حساب بدلالة n ، المجموع T_n : $T_n = 16 \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 2n - 18$
4 نقاط		التمرين الثاني (4 نقاط)
	0,75	1. أ - نعلم النقط A ، B و C :
	0,75	ب - طبيعة الرباعي $OABC$: متوازي أضلاع. التعليل: $\frac{z_B - z_C}{z_A} = 1$ أي $\overline{OA} = \overline{CB}$
	0,5	ج - لاحقة النقطة Ω مركز الرباعي $OABC$: $z_\Omega = \frac{3}{2} + i$
	0,75	2. لدينا: $M\Omega = 3$ ، الدائرة التي مركزها Ω و نصف قطرها 3 + الإنشاء
	0,75	3. أ - $\Delta' = (2i)^2$ وعليه $z_0 = 3 - 2i$ و $z_1 = 3 + 2i$ أو العكس.
	0,5	ب - $ z - z_0 = z - z_1 $ معناه $AM = BM$ ؛ إذن المجموعة المطلوبة هي محور القطعة $[AB]$ أي محور الفواصل.

عناصر الإجابة للموضوع الثاني		العلامة												
		مجزأة												
		المجموع												
التمرين الثالث (5 نقاط)														
1	1. أ - التمثيل الوسيطى للمستقيم (Δ) : $\lambda \in \mathbb{R}$; $\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 4\lambda \\ z = 7 - \lambda \end{cases}$	0,5												
0,5	ب - C تنتمي إلى (Δ) لأنه بالتعويض بإحداثيات C نجد $\lambda = 1$ أو $\overline{BC} = \overline{u}$	0,5												
1	ج - $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ $\overrightarrow{BC}(1; -4; -1)$ $\overrightarrow{AB}(2; 0; 2)$	0,5												
0,5	د - $d(A, (\Delta)) = AB = 2\sqrt{2}$	0,5												
0,75	2. أ - عبارة $h(t)$ بدلالة t : $h(t) = AM = \sqrt{8 + 18t^2}$	0,75												
0,5	ب - تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي t : $h'(t) = \frac{18t}{\sqrt{18t^2 + 8}}$	0,5												
0,75	ج - AM أصغر ما يمكن عندما يكون $h'(t) = 0$ أي $t = 0$ القيمة الحدية الصغرى للدالة h هي $h(0) = 2\sqrt{2}$ ومنه $h(0) = d(A, (\Delta))$.	0,75												
التمرين الرابع: (07 نقاط)														
0,5 x 2	1. أ - حساب النهايتين: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	0,5 x 2												
0,5	ب - حساب $f'(x) = e^x - e$	0,5												
0,5	دراسة إشارة $f'(x)$: $\begin{array}{c} + \\ - \end{array}$	0,5												
0,5	ج - جدول تغيرات الدالة f :	0,5												
<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>$-$</td><td>$+$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>-1</td><td>$+\infty$</td></tr></table>			x	$-\infty$	1	$+\infty$	$f'(x)$		$-$	$+$	$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$
x	$-\infty$	1	$+\infty$											
$f'(x)$		$-$	$+$											
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$											
0,5	2. أ - $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-ex - 1)] = 0$	0,5												
0,5	ب - معادلة (T) مماس $(\mathcal{C}_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 : $y = (1 - e)x$	0,5												
1	ج - f مستمرة و متزايدة تماما على $[1,75; 1,76]$ $f(1,75) = -0,0024$ $f(1,76) = 0,028$	1												
1	د - رسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحني $(\mathcal{C}_f)$ على المجال $]-\infty; 2]$.	1												
1	3. أ - حساب بدلالة α ، المساحة $A(\alpha)$: $A(\alpha) = \left(-e^\alpha + \frac{1}{2}e\alpha^2 + \alpha + 1\right) ua$	1												
0,5	ب - من $f(\alpha) = 0$ نجد $e^\alpha = e\alpha + 1$ و بالتعويض نجد أن : $A(\alpha) = \left(\frac{1}{2}e\alpha^2 - e\alpha + \alpha\right) ua$	0,5												